

TYLENOL®

Qué hacer si su hijo tiene malestar después de la vacunación⁹

Su hijo puede necesitar más cuidados después de la vacunación. Algunas vacunas como difteria, polio, sarampión, influenza, que protegen a los niños de enfermedades graves pueden también causar un poco de malestar, como parte de la activación esperable del sistema de defensas para reconocer dichas enfermedades.



¿Qué hacer si cree que su hijo tiene fiebre?

Tome la temperatura de su hijo con un termómetro, preferiblemente digital. Revise si la temperatura persiste o se incrementa (38 °C o más). Si esto ocurre consulte a su médico.



Otras medidas que puede considerar

- Vístalo con ropa ligera, evite cubrirlo demasiado.
- Asegúrese de que el niño tome mucho líquido.
- Dele a su hijo un medicamento para reducir la fiebre y el dolor como paracetamol. La dosis debe basarse en el peso de su hijo. Consulte la tabla de dosificación y siga las instrucciones de su médico.
- Vuelva a controlar la temperatura de su hijo después de una hora y monitoree constantemente su evolución



¿Cómo controlar la irritabilidad de su hijo?

- Algunos niños pueden parecer irritables por causa del dolor o la fiebre. Un paracetamol como Tylenol® puede ayudarle a disminuir el malestar.
- Si su hijo presenta inflamación en la zona donde le fue aplicada la vacuna, puede usar una toallita húmeda sobre el área para ayudar a controlar la inflamación local.

